

# 1A JORNADA DE VALIDACIÓ SANITÀRIA

**28 DE NOVEMBRE**  
**Auditori Josep Irla**



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**



**CatSalut**

Servei Català  
de la Salut

Regió Sanitària Girona



Institut Català de la Salut  
**Direcció d'Atenció Primària**  
**Girona**

# Finasteride


**Autor** A.Carolina Berengue González  
Metgessa de Família/Directora  
EAP Girona 4

# Cas Clínic

- Dona de 58 anys
- AP:
  - Ansietat
  - HTA
  - Migranya

# Cas Clínic

- Consulta per caiguda de cabells, sobretot en zones de frontals, des de fa uns mesos.
- El metge de família detecta patologia i dona a l'pacient receptar minoxidil.
- La pacient va fer un seguiment i persisteix el seu problema. dermatoscòpia i histopatologia de miniatura. Li explicant l'etiologia androgènica i li recomanant les probabilitats de resposta.
- Donada la insistència de la pacient, deriva a Dermatologia.
- Acudeix a Dermatologia i acudeix a la nostra consulta novament, amb la indicació de finasteride i amb un document «off label»



# Evidència Científica

- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)  
(2017)  
<https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-surveiller-le-risque-de-depression-et-d-idees-suicidaires-Point-d-information>
- (2012)  
<https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-Propecia-et-generiques-dans-le-traitement-de-la-calvitie-chez-l-homme-jeune-alopecie-androgenetique-surveillance-des-effets-secondaires-Point-d-information>
- Société Française de Dermatologie: (19.03.19)  
<http://www.sfdermato.org/actualites/finasteride-propecia-chibro-proscar-gene-riques-rappel-sur-les-risques-de-troubles-de-la-fonction-sexuelle-et-de-troubles-psychiatriques.html>  
Les médicaments à base de finastéride sont indiqués uniquement chez l'homme et strictement contre-indiqués chez la [femme](#).

Anem a pams, va  
l'esbudellad



Com va començar el problema?

- L'alopecia androgénica és la forma més freqüent d'alopecia tant en homes com en dones.
- Té una causa hormonal i genètica i clínicament es caracteritza per l'afinament progressiu del cabell (miniaturització) induït per les hormones masculines (andrògens).
- Alts nivells de dihidrotestosterona (DHT) en els fol·licles capil·lars del cuir cabellut.
- La finasterida bloqueja la transformació de la testosterona perifèrica en dihidrotestosterona ([DHT](#))

# Evidència Científica

- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)  
(2017)  
<https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-surveiller-le-risque-de-depression-et-d-idees-suicidaires-Point-d-information>
- (2012)  
<https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-Propecia-et-generiques-dans-le-traitement-de-la-calvitie-chez-l-homme-jeune-alopecie-androgenetique-surveillance-des-effets-secondaires-Point-d-information>
- Société Française de Dermatologie: (19.03.19)  
<http://www.sfdermato.org/actualites/finasteride-propecia-chibro-proscar-gene-riques-rappel-sur-les-risques-de-troubles-de-la-fonction-sexuelle-et-de-troubles-psychiatriques.html>  
Les médicaments à base de finastéride sont indiqués uniquement chez l'homme et strictement contre-indiqués chez la femme.



# Finasterida en alopecia

- S'associa a casos de depressió i ideació suïcida
- Augment d'ansietat
- Canvis d'humor
- Disminució de libido
- Disfunció erèctil que persisteix malgrat finalitzar tractament en alguns casos
- Trastorns d'ejaculació
- Augmenta el risc de càncer de mama en dones
- Sensibilitat, engrandiment de mames i secreccions
- Risc de malformacions genitals en fetes
- **CONTRAINDICADA EN DONES**
- La dosi de 1mg ho indiquen en al... mames i de 5mg en el tractament d'Hiperplàsia... a

NO FINANÇAT

# Alopecia androgènica. Tractament actual

- ✓ **Minoxidilo** (exclòs SNS) solució: “alopècia” en general per a dones i homes
- ✓ **Ciproterona** (inclòs SNS, recepta normal): “alopècia androgenética severa” en dones amb manifestacions greus de androgenització
- ✓ **Finasteride 2,5-\*5mg/dia:**
  - Existeixen 2 presentacions comercialitzades:
    - 1 mg (exclòs SNS): indicat en alopecia androgenetica masculina. **Contraindicada en dones** (riscos durant l'embaràs i lactància).
    - 5 mg (inclòs SNS): indicat en HBP en homes. No indicat en dones i contraindicat en l'embaràs.
    - Actualment els homes amb alopecia androgenética que són tractats amb finasteride es financen el 100% del tractament ja que està exclòs de finançament.

---

# Gràcies!



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**



**CatSalut**

Servei Català  
de la Salut

Regió Sanitària Girona



Institut Català de la Salut  
**Direcció d'Atenció Primària  
Girona**